



សៀវភៅ អនុផលព្រៃឈើមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច នៅភ្នំគូលេន



មាតិកា

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ	1
សេចក្តីផ្តើម	2
ឫស្សីឃ្លេ (<i>Bambusa bambos</i>)	5
វល្លិ៍ឡឡ (<i>Lygodium salicifolium</i>)	7
ក្រវា (<i>Amomum ovoideum</i>)	9
ខាន់ម៉ា (<i>Ancistrocladus tectorius</i>)	11
កុមារពេជ្យ (<i>Stephania rotunba</i> Lour)	13
គុយ (<i>Willughbeia edulis</i>)	15
វល្លិ៍ធ្នូក (<i>Secamone lagenifera</i>)	17
វិចេកស្រុក (<i>Pandanus humilis</i>)	19
ផ្តៅក្រែក (<i>Calamus viminalis</i>)	21
ផ្តៅឈ្នាំង (<i>Calamus palustris</i>)	23
ផ្តៅសោម (<i>Daemonorops jenkinsiana</i>)	25
ផ្តៅជំបង (<i>Calamus rudentum</i>)	27
សែសីង (<i>Calamus tetradactylus</i>)	29
ចង្កូរ (<i>Plectocomia pierreana</i>)	31
ត្រាច (<i>Dipterocarpus intricatus</i>)	33
ក្រពុលបាយ (<i>Litsea glutinosa</i>)	35

រំដួល (<i>Melodorum fruticosum</i>)	37
កប្បីរ (<i>Cinnamomum camphora</i>)	39
ស្តៅ (<i>Azadirachta indica</i>)	41
ផ្លែក (<i>Shorea obtuse</i>)	43
ឈើទាលទឹក (<i>Dipterocarpus alatus</i>)	45
គូលែន (<i>Litchi chinensis</i>)	47
អន្ទង់-ស (<i>Eurycoma longifolia</i>)	49
មើមថ្នាំចិន (<i>Smilax glabra</i>)	51
ចន្ទីក្រស្នា (<i>Aquilaria crassna</i>)	53
ឯកសារយោង	54

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់នាយកដ្ឋានជីវៈចម្រុះ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និងក្រសួងបរិស្ថាន ដែលបានសម្របសម្រួល និងផ្តួចផ្តើមឱ្យមានគម្រោងក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីធនធានជីវៈចម្រុះដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច នៅឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ន-នរោត្តម “ភ្នំគូលែន” ក្នុងគោលបំណងកត់ត្រានូវប្រភេទអនុផលព្រៃឈើ ឬផលិតផលពីជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ និងសក្តានុពលនៃការប្រើប្រាស់ និងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រភេទទាំងនោះដើម្បីជម្រុញនិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងជីវភាពប្រជាសហគមន៍បានប្រសើរឡើង។

សូមអរគុណជាពិសេសដល់អង្គការ GIZ ដែលបានផ្តល់មូលនិធិតាមរយៈ GFA Consulting Group ដល់ការអនុវត្តគម្រោងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងចងក្រងឯកសារនេះឡើងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សារធារណជនឱ្យបានស្គាល់ពីប្រភេទអនុផលព្រៃឈើមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនៅ ភ្នំគូលែន និងជាឯកសារមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែន ក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិផ្សេងទៀតឱ្យបានដឹងពីប្រភេទអនុផលព្រៃឈើដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច ដែលអាចជួយឱ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់បានកាន់តែប្រសើរឡើង។

សូមថ្លែងនូវការអរគុណផងដែរដល់ មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបដែលបានជួយសម្របសម្រួលដល់ក្រុមសិក្សាក្នុងការធ្វើការសម្ភាសន៍ ការចុះទៅក្នុងព្រៃផ្ទាល់ និងរៀបចំប្រជុំជាមួយប្រជាសហគមន៍។

យើងក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងអាជ្ញាធរព្រះវិហារ ដែលបានចូលរួមពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់ប្រភេទនីមួយៗ។

សេចក្តីផ្តើម

បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួនជាង ៥០កន្លែង ដែលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីជាង ៧,៥លានហិចតា ឬស្មើនឹងជិត ៤១% នៃផ្ទៃប្រទេសទាំងមូល។ ហើយប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលមានភាគរយផ្ទៃដីតំបន់ការពារធម្មជាតិខ្ពស់ជាងគេ។ តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវៈចម្រុះថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់តំបន់ និងពិភពលោក។ តាមការប៉ាន់ស្មាន ៤០% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និង ៨០% នៃសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកក្រីក្រ គឺបានមកពីធនធានជីវៈចម្រុះ ហើយជីវៈចម្រុះនេះទៀតសោតក៏ចូលរួមក្នុងការបង្កើនភាពធន់ទ្រាំនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរបស់ពិភពលោក ពិសេសការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ក្រៅពីនេះ តំបន់ការពារធម្មជាតិក៏បានផ្តល់នូវផលិតផលធម្មជាតិ និងសេវាកម្មចម្រុះយ៉ាងសម្បូរបែបដល់សហគមន៍ជនបទដែលពឹងផ្អែកលើធនធានព្រៃឈើដូចជា៖ ប្រភេទឥដ្ឋ ឱសថ ជម្រក និងអនុផលព្រៃឈើ។

ឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ន-នរោត្តម “ភ្នំគូលែន” ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកំណត់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យនៅឆ្នាំ១៩៩៣ លើផ្ទៃដី ៣៧,៣៧៥ហិចតា គ្របដណ្តប់ដោយស្រុកចំនួនបីនៃខេត្តសៀមរាប គឺស្រុកស្វាយលើ ស្រុកបន្ទាយស្រី និងស្រុកវ៉ាន។ ប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកភ្នំគូលែន ជាភ្នំសក្តិសិទ្ធជាងគេនៅកម្ពុជា និងជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់ការគោរពបូជា និងការលំហែរនៅពេលចុងសប្តាហ៍ និងនៅពេលបុណ្យម្តងៗ។ ឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់មានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ការអភិរក្សដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពចម្បងៗចំនួនបី គឺ៖ ភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះ សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងមុខងារសង្គម។

តាមការសិក្សាបានបង្ហាញថា ឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនមានរុក្ខជាតិចំនួន ៧៧៩ប្រភេទ សត្វស្លាប ១៩៨ប្រភេទ ល្អិត១០ប្រភេទ ថលជលិក២៥ប្រភេទ និងចំនួនប្រចៀៗ២៥ប្រភេទ។ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់ឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែន គឺការសិក្សាថ្មីៗបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមរុក្ខជាតិទាំង ៧៧៩ប្រភេទ គឺមានចំនួន ២៨ប្រភេទ ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមស្តីពីប្រភេទរងការគ្រមាមកំហែងរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សធម្មជាតិ និងធនធានធម្មជាតិ (IUCN)។

សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសំខាន់ៗនៅឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនរួមមាន៖ ថ្មភក់ ព្រៃឈើ និងប្រភព ទឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ខេត្តសៀមរាប ជាពិសេសសេវាកម្មប្រភពទឹកក្រោមដីដែលជាអ្នករក្សា ស្ថិរភាពគ្រឹះប្រាសាទនានាក្នុងតំបន់អង្គរ។ យោងតាមការសិក្សា ភ្នំគូលែនជាប្រភពផ្តល់ទឹកដល់ បណ្តាញផ្លូវទឹកទាំង៣៦នៅខេត្តសៀមរាបទាំងមូល។

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃឈើនៅភ្នំគូលែន បានផ្តល់គុណតម្លៃយ៉ាងពិសេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង មូលដ្ឋានតាមរយៈការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងការទាញយកធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ការ ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ក្នុងគ្រួសារ និងពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសេសអនុផលព្រៃឈើ ដែលរួមមាន៖ រុក្ខជាតិឱសថ ផ្លែឈើព្រៃ ជ័រទឹក និងគ្រឿងលម្អ។

នៅក្នុងឯកសារនេះ យើងសូមលើកយកនូវរុក្ខជាតិដែលជាអនុផលព្រៃឈើមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច នៅ ភ្នំគូលែនចំនួន ២៥ប្រភេទ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានចំណេះដឹងដល់ប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុង តំបន់ឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែន ក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិផ្សេង ទៀតឱ្យបានដឹងពីប្រភេទអនុផលព្រៃឈើដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច ដែលអាចជួយឱ្យជីវភាពរបស់ ពួកគាត់បានកាន់តែប្រសើរឡើង ជាពិសេសជម្រុញការចូលរួមអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ ឫស្សីឃ្លែ
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Spiny bamboo, giant thorny bamboo, indian thorny bamboo
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Bambusa bambos* (L.) Voss
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចិនភាគខាងត្បូង និងឥណ្ឌា
- របាយប្រភេទ ៖ ជាឫស្សីធំម្យ៉ាង មានរបាយធម្មជាតិដុះនៅក្នុងប្រទេស
ចិន ឥណ្ឌា ភូមា ថៃ ឡាវ កម្ពុជា និងនៅវៀតណាម។
បច្ចុប្បន្ន ឫស្សីឃ្លែ ត្រូវបានគេដាំដុះសឹងពាសពេញ
តំបន់ត្រូពិក និងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាពិសេសនៅ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសសិង្ហបុរី ឧបទ្វីបម៉ាឡេស៊ី ថៃ
និងប្រទេសហ្វីលីពីន។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ ឫស្សីឃ្លែមិនទាន់ត្រូវបានគេសិក្សាយកម្ល៉េះពីស្ថានភាព
គម្រោមកំហែងរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN
នៅឡើយទេ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ស្លឹកខ្ចីរបស់ឫស្សីឃ្លែពពួកសត្វព្រៃ និងសត្វពាហនៈចូល
ចិត្តស៊ីណាស់។ ទំពាំងរបស់វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជា
បន្លែសម្រាប់ស្លរធ្វើម្ហូប។ ដើមរបស់វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់
ច្រើនយ៉ាងសម្រាប់សង់ផ្ទះ សាងសង់ស្ពាន និងធ្វើកូន
ជាដើម។ ក្រមួនដែលមានជុំវិញដើមខ្លីៗរបស់វាគឺគេអាច
យកទៅធ្វើក្រដាសកាបោនបាន។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ វល្លិ៍ឡៃឡ
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Willow-leaved climbing fern
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Lygodium salicifolium* C.Presl
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចិន ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ ប៊ូតាន
- របាយប្រភេទ ៖ វល្លិ៍ឡៃឡ មានរបាយដុះសឹងពាសពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ រួមមាន ប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ភូមា និងមានដុះនៅចិន ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ និងប៊ូតាន។ នៅកម្ពុជា វាមានដុះជាច្រើននៅតាមព្រៃស្រោង និងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោងនៃតំបន់ទំនាបសឹងពាសពេញប្រទេស មាននៅខេត្តសៀមរាប ពោធិ៍សាត់ កោះកុង កំពត ក្រចេះ មណ្ឌលគីរី រតនគិរី ព្រះសីហនុ និងខេត្តព្រះវិហារជាដើម។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ វល្លិ៍ឡៃឡមិនទាន់ត្រូវបានគេសិក្សាវាយតម្លៃពីស្ថានភាពគម្រាមកំហែងរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រភេទរាតត្បាតដែលអាចផ្តល់ផលប៉ះពាល់ ដល់ការលូតលាស់របស់ដើមឈើដទៃដែលវារោងឡើង។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់៖ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ផ្នែកដើមរបស់វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើជាសម្ភារធម្មាញ ដែលពេលខ្លះត្រូវបានត្បាញលាយជាមួយផ្កានិងឫស្សីធ្វើជាកាបូបដៃ មួក កាំព្រួង និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនប្រភេទទៀត។ ពេលខ្លះផ្នែកសំបកនៃដើមវល្លិ៍របស់វា ក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងសោភ័ណភាពបន្ថែមទៅលើវត្ថុ ឬសម្ភារមួយចំនួន ដែលត្រូវបានគេត្បាញរួចហើយមាន កាំព្រួង និងប្រភេទវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗទៀត។

-



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ ក្រកោ
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Green Cardamom
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Amomum ovoideum* Pierre ex Gagnep
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
- របាយប្រភេទ ៖ ជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទ ដុះច្រើននៅក្នុងព្រៃស្រោង តំបន់ទំនាប និងតំបន់ព្រៃជ្រុះស្លឹក តែក៏មានដុះផងដែរនៅក្នុងព្រៃស្រោងតំបន់ភ្នំ។ ក្រកោ មានរបាយដុះសឹងពាសពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលរបាយធម្មជាតិរបស់វាគេឃើញមានដុះនៅប្រទេសភូមា ថៃ កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី និងឥណ្ឌូនេស៊ី។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ ក្រកោ មិនត្រូវបានគេចាត់ចូលជាប្រភេទទទួលរងការគម្រាមកំហែងទេ ប៉ុន្តែតម្រូវការដឹងខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋាន (នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍) នៅក្នុងក្បួនឱសថបុរាណ និងអាហារ បានបង្កឱ្យមានការប្រមូលក្រកោពីព្រៃនៅក្នុងកម្រិតហួសប្រមាណ ជាពិសេសគឺការប្រមូលគ្រាប់ច្រើនលើសលុប ដែលអាចបង្កឱ្យបាត់បង់នានាភាពសេនេទិចរបស់វា។ លើសពីនេះ ការបាត់បង់ព្រៃ និងការកាប់បំផ្លាញប្រភេទឈើធំៗ បានធ្វើឱ្យបាត់បង់ជម្រក ម្លប់ដែលសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់វា។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្រកោត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភេទអនុផលព្រៃឈើ ដែលផ្លែ និងគ្រាប់របស់វាតែងត្រូវបានប្រជាជនក្នុងតំបន់មូលដ្ឋាន ប្រមូលយកមកប្រើប្រាស់ទាំងនៅក្នុងក្បួនឱសថបុរាណ និងបរិភោគជាអាហារ។ នៅក្នុងក្បួនឱសថបុរាណខ្មែរ ក្រកោត្រូវបានប្រើប្រាស់ព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវដង្ហើម និងប្រព័ន្ធណែយអាហារ។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ ខាន់ម៉ា
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ គ្មាន
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Ancistrocladus tectorius* (Lour.) Merr.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចិនភាគខាងត្បូង ឥណ្ឌា
- របាយប្រភេទ ៖ ខាន់ម៉ា ជាប្រភេទរុក្ខជាតិវិល្លីមានដុះនៅក្នុងប្រភេទ
ព្រៃតំបន់ទំនាប ព្រៃតំបន់ភ្នំ និងព្រៃស្រោង។ របាយ
របស់វានៅក្នុងធម្មជាតិ មានដុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា សិង្ហបុរី
ថៃ និងវៀតណាម។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ខាន់ម៉ាមាន
ដុះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រៃសឹងគ្រប់ខេត្ត។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ ខាន់ម៉ា មិនទាន់ត្រូវបានគេសិក្សាវាយតម្លៃពីស្ថានភាព
គំរាមកំហែងរបស់វា នៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN
នៅឡើយទេ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ស្លឹកខាន់ម៉ា (ស្លឹកចាស់ៗ) ត្រូវបានគេប្រមូលក្រង និង
ដេរធ្វើជញ្ជាំងផ្ទះ និងប្រក់ដំបូលផ្ទះជាដើម។ រុក្ខជាតិ
ទាំងមូល និងឫសរបស់វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់
ព្យាបាលឈឺឆ្អឹងខ្នងស្លឹក ជួយធ្វើឱ្យស្រួលក្រោយឆ្លងទន្លេ
ឆាប់មានកំលាំង ប្រើព្យាបាលគ្រុនចាញ់ និងរាគមូល
ដោយការដាំទឹកផឹក ឬក៏ត្រាំស្រាផឹក។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ កុមារពេជ្យ
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ គ្មាន
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Stephania rotunba* Lour.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់ឥណ្ឌូចិន
- របាយប្រភេទ ៖ ឈ្មោះវិស្វកម្មមានប្រវែងពី ៥-១៥ ម ដុះដោយខ្លួនឯងនៅតាមព្រៃភ្នំ ដែនដីសម្បូរថ្ម ឬដំបូកមានជាតិកំបោរ មានរបាយដុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម ជាពិសេសមានច្រើនជាងគេនៅប្រទេសវៀតណាមភាគខាងជើង។ នៅកម្ពុជា កុមារពេជ្យត្រូវបានជួបប្រទះច្រើនជាងគេនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ កុមារពេជ្យ មិនទាន់ត្រូវបានគេសិក្សាវាយតម្លៃពីស្ថានភាពគំរកំហែងរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN នៅឡើយទេ
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ មើមរបស់កុមារពេជ្យមានទំហំធំៗ រាងមូលពណ៌ត្នោត អាចមានទម្ងន់ដល់២០គីឡូក្រាម។ តាមក្បួនឱសថបុរាណមើមនេះ ជាថ្នាំជំនួយលើកកំលាំង និងសម្រាប់ ព្យាបាលជម្ងឺកន្ត្រាក់ញាក់សាច់ដុំ ជាពិសេសសាច់ដុំនៃគ្រឿងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ព្យាបាលការឈឺពោះ ឈឺក្រពះ ឈឺក្បាល ឈឺសន្លាក់ដៃជើង ព្យាបាលស្នេស្ស និងជំនួយផ្លូវភេទ។ ចំណែកវិស្វ និងស្លឹកព្យាបាល របេងស្ងួត ហឺត រាគមូល ណែនដើមទ្រូង ទឹកនាមផ្អែម និងទម្លាក់រដូវ។ ស្លឹករបស់វាល្វឹងប្រើបិទរបួស និងជំពៅរាំរ៉ៃ។ ផ្ការបស់វាជួយដល់ការរំលាយអាហារ និងកន្ទួលសើស្បែក។






- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ វល្លិ៍ធ្លក
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ គ្មាន
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Secamone lagenifera* (Kerr) Klack.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
- របាយប្រភេទ ៖ វល្លិ៍ធ្លក មានរបាយធម្មជាតិដុះតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា វល្លិ៍ធ្លកត្រូវបានគេកាត់ត្រាមានដុះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ កំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តសៀមរាបជាដើម។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ គេមិនទាន់ដឹងអំពីស្ថានភាពអភិរក្សរបស់វល្លិ៍ធ្លកនៅឡើយទេ (មិនទាន់មានការសិក្សាវាយតម្លៃនៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN) ប៉ុន្តែវាក៏មិនត្រូវបានគេពិចារណាចាត់ទុកជាប្រភេទទទួលរងការគំរាមកំហែងនោះទេ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ មិនមានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់របស់វល្លិ៍ធ្លកនោះទេ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា វល្លិ៍ធ្លកត្រូវបានសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅលើភ្នំគូលែនយកមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាសម្ភារៈតម្បាញ (ដូចវល្លិ៍ឡឡដែរ) ដូចជា ធ្វើជាកងដែ និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនទៀត។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ រំចេកស្រុក
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ គ្មាន
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Pandanus humilis* Lour.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
- របាយប្រភេទ ៖ រំចេកស្រុក មានដុះនៅក្នុងព្រៃតំបន់ទំនាបមានសំណើម (ក្បែរមាត់ទឹកដូចជា ស្ទឹង ឬអូរជាដើម) ព្រៃគម្លាត លើទួល និងមានដុះនៅប្រភេទដីមានថ្មស្ថិតនៅក្បែរមាត់ទឹក។ របាយធម្មជាតិរបស់វាមានដុះនៅកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ និងម៉ាឡេស៊ី។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ រំចេកស្រុក មិនត្រូវបានគេព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាគម្រាមកំហែងចំពោះវាឡើយ ហើយក៏មិនមានការសិក្សាវាយតម្លៃពីស្ថានភាពអភិរក្សរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN ទេ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ស្លឹករំចេកគេប្រើសម្រាប់ត្បាញកន្ទួល ផ្ការបស់វាក្រអូបគេប្រើសម្រាប់អប់សំពត់អាវ។ ឫសរបស់វាគេប្រើសម្រាប់ធ្វើថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺស្វាយ និងប្រមេះ។ ឫសចេញពីដើមមិនទាន់ដល់ដី គេប្រើជំនួយកំលាំង ភេទ និងបញ្ចុះទឹកនោម។ ឫសវាប្រើលាយជាមួយគល់ម្នាស់ដាំផឹក ដើម្បីបញ្ចុះទឹកនោម ព្យាបាលនោមតឹង នោមទាស់ នោមចេញឈាម។ គេនិយមដាំរំចេកស្រុកធ្វើជាបងស្រស់។





- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ ផ្ដៅឈ្ងាំង, ផ្ដៅជូរ, ក្បង់, កន្រ្ទាង, តាអូញ
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Rattan
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Calamus palustris* Griff.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
- របាយប្រភេទ ៖ ទំហំដើមធំ ប្រវែងដើមរហូតដល់៣០ម ដុះនៅព្រៃស្រោងតំបន់ទំនាបឬតំបន់ភ្នំមធ្យម ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ពេលខ្លះមានដុះតាមព្រៃលិចទឹកជាដើម និងជួនកាលដុះនៅក្បែរភូមិ។ របាយរបស់វាមានដុះនៅកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ភូមា ថៃ និងម៉ាឡេស៊ី។ ផ្ដៅឈ្ងាំងត្រូវបានគេប្រទះឃើញមានដុះនៅក្នុងព្រៃក្រាស់ល្មមសឹងពាសពេញប្រទេសកម្ពុជា។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ ផ្ដៅឈ្ងាំង ជាប្រភេទផ្ដៅដែលមិនត្រូវបានគេព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាអភិរក្សរបស់វានៅឡើយទេ ហើយក៏មិនទាន់មានការសិក្សាវាយតម្លៃស្ថានភាពអភិរក្សរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ដែរ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ផ្លែ និងគមរបស់ផ្ដៅឈ្ងាំងអាចបរិភោគបាន ដើមរបស់វាទន់ និងជាប់ល្អណាស់ គេប្រើការបានច្រើនយ៉ាងសម្រាប់ធ្វើទូរសៀវភៅ កៅអី ត្បាញកន្ត្រក កញ្ជ្រែងល្អី និងវេញជាខ្សែជាដើម។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ ផ្ដៅសោម
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Rattan
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Daemonorops jenkinsiana* (Griff.) Mart.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចិន ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ ប៊ុយតាន
- របាយប្រភេទ ៖ ប្រវែងដើមរហូតដល់ ៣០ម ដុះនៅក្នុងព្រៃស្រោង តំបន់ទំនាបឬតំបន់ភ្នំរាប តំបន់មានសំណើមនៃ ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃលិចទឹក ហើយវាធន់នឹង តំបន់គេរុករាន។ របាយធម្មជាតិរបស់វាមានដុះនៅ កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម បង់ក្លាដែស ប៊ុយតាន ចិន ឥណ្ឌា ភូមា នេប៉ាល់ និងប្រទេសថៃ។ ផ្ដៅសោមមាន របាយដុះសឹងពាសពេញប្រទេសកម្ពុជា។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ ផ្ដៅសោម ជាប្រភេទផ្ដៅដែលមិនត្រូវបានគេព្រួយ បារម្ភលើបញ្ហាអភិរក្សរបស់វានៅឡើយទេ ហើយក៏ មិនទាន់មានការសិក្សាវាយតម្លៃស្ថានភាពអភិរក្ស របស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ដែរ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ គមរបស់ផ្ដៅសោមត្រូវបានគេយកមកបរិភោគធ្វើជា បន្លែ។ ផ្នែកដើមរបស់វាងាយពន់បាន ដែលត្រូវបាន គេប្រមូលយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផលិតកម្មគ្រឿង សង្ហារឹម (ធ្វើតុ ទូ កៅអី...)។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ ផ្ដៅដំបង
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Rattan
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Calamus rudentum* Lour.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
- របាយប្រភេទ ៖ មានទំហំដើមធំ ប្រវែងដើមវែងរហូតដល់ ១០០មជុះនៅក្នុងព្រៃស្រោងតំបន់ទំនាប និងព្រៃលូតលាស់បន្ទាប់ (Succession Forest) ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃលិចទឹកដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយព្រៃជ្រុះស្លឹក Dipterocarp។ របាយក្នុងធម្មជាតិរបស់វាមានជុះនៅកម្ពុជា ឡាវភាគខាងត្បូង វៀតណាម ភូមា និងប្រទេសថៃ។ ផ្ដៅដំបង មានរបាយពាសពេញភាគខាងកើត ភាគអាគ្នេយ៍ និងភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជា។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ ការអភិរក្សផ្ដៅដំបងមិនទាន់ត្រូវបានគេយកចិត្តទុក និងដឹងពីស្ថានភាពអភិរក្សបច្ចុប្បន្នរបស់វានៅឡើយទេ ហើយក៏មិនទាន់មានការសិក្សាវាយតម្លៃស្ថានភាពអភិរក្សរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ដែរ។ តែយ៉ាងណាវិញ ផ្ដៅដំបងត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាប្រភេទផ្ដៅដែលគេចូលចិត្តប្រមូលសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅវៀតណាម ដែលបង្កធ្វើឱ្យមានការគំរាមកំហែងនៃការប្រមូលហួសកម្រិតពីព្រៃ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ផ្លែរបស់ផ្ដៅដំបងអាចបរិភោគបាន ដើមរបស់វាគេប្រើការបានច្រើនយ៉ាងដូចជា ធ្វើកូន ធ្វើខ្សែ ធ្វើពួរចងនាវា ធ្វើទូរសៀវភៅ កៅអី តុ ទូ កន្ត្រកកព្រែង ល្អីខ្សែចងសត្វពាហនៈ និងធ្វើឈើច្រត់ប្រណិត ។ល។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ សែសីង, ផ្ដៅចង្រិត, ផ្ដៅល្អាក់, ផ្ដៅសាង, ផ្ដៅសែង
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Rattan
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Calamus tetradactylus* Hance
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ នៅស្រុកហៃណាំ (Hainan) ប្រទេសចិន
- របាយប្រភេទ ៖ ប្រភេទផ្ដៅដ៏ធំ មានប្រវែង ២០-៧០ម មានដុះនៅក្នុងតំបន់ព្រៃស្រោងតំបន់ទំនាប និងតំបន់ព្រៃជ្រុះស្លឹកចម្រុះទទួលរងការរំខាន។ របាយធម្មជាតិរបស់វាមានដុះនៅក្នុងកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ និងចិន។ នៅប្រទេសកម្ពុជា គេប្រទះឃើញវាមានដុះនៅតាមព្រៃនៅជិតមាត់ទឹក និងតាមតំបន់ទំនាបសឹងពាសពេញប្រទេសកម្ពុជា។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ សែសីងមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងអំពីស្ថានភាពអភិរក្សរបស់វានៅឡើយទេ ហើយក៏មិនទាន់មានការសិក្សាវាយតម្លៃស្ថានភាពអភិរក្សរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ដែរ។ នៅប្រទេសថៃ សែសីងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភេទផ្ដៅមិនទាន់ទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅឡើយទេ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ផ្លែរបស់ផ្ដៅសែសីងនេះអាចបរិភោគបាន ដើមរបស់វាគេអាចប្រើប្រាស់ធ្វើ តុ ទូ កៅអី និងវេញជាខ្សែរន្ទះជាដើម ហើយឫសរបស់វាគេអាចយកស្វាជីកព្យាបាលអាការៈគ្រុនក្តៅ។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ ចង្កូរ, ត្រៃសអំបោះ
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Rattan
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Plectocomia pierreana* Becc.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងប្រទេសចិន
- របាយប្រភេទ ៖ មានប្រវែង ១០-៣០ម ដុះនៅក្នុងព្រៃស្រោងតំបន់ទំនាប ឬតំបន់ភ្នំ និងនៅក្នុងព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោងទទួលរងការរំខាន។ របាយធម្មជាតិរបស់វាមាននៅក្នុងកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ និងប្រទេសចិន។ ផ្តៅត្រៃសអំបោះមានដុះសឹងពាសពេញតំបន់ព្រៃក្រាស់ និងព្រៃស្រោងនៅប្រទេសកម្ពុជា និងសម្បូរដុះនៅតាមជួរភ្នំក្រវាញ។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ ផ្តៅត្រៃសអំបោះមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងអំពីស្ថានភាពអភិរក្សក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់វានៅឡើយទេ ហើយក៏មិនទាន់មានការសិក្សាវាយតម្លៃស្ថានភាពអភិរក្សរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ដែរ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ផ្នែកដើមរបស់វាគេអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជាខ្សែពួរ និងធ្វើជាកញ្ជើ ល្អី ទូ កៅអី ។ល។





- | | |
|---------------------------------|--|
| - ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ | ៖ ក្រពុលបាយ |
| - ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស | ៖ Indian laurel, Soft bollygum, Bolly beech, Brown bollygum, |
| - ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ | ៖ <i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C.B.Rob. |
| - ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ | ៖ នៅតំបន់អាស៊ីត្រូពិក |
| - របាយប្រភេទ | ៖ ព្រឹក្សមានកម្ពស់ ៥-១៥ម ដុះក្នុងព្រៃធំ និងព្រៃក្រាស់ មជ្ឈមនៅតំបន់អាស៊ីត្រូពិក។ របាយធម្មជាតិរបស់វា មាននៅឥណ្ឌា បង់ក្លាដែស ម៉ាឡេស៊ី កម្ពុជា ឡាវ ភូមា នេប៉ាល់ ញូហ្គីនេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីន ស្រីលង្កា ថៃ និងវៀតណាម។ នៅកម្ពុជា វាមានដុះនៅ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពត កោះកុង សៀមរាប និងនៅ តំបន់ទន្លេមេគង្គ (រវាងក្រចេះ និងស្ទឹងត្រែង)។ |
| - ស្ថានភាពអភិរក្ស | ៖ ក្រពុលបាយ មិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងអំពីស្ថានភាព អភិរក្សក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់វានៅឡើយទេ ហើយ ក៏មិនទាន់មានការសិក្សាវាយតម្លៃស្ថានភាពអភិរក្ស របស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ដែរ។ |
| - អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ | ៖ ស្លឹកក្រពុលបាយអាចធ្វើចំណីសត្វគោ-ក្របីបាន។ ក្នុងក្បួនឱសថបុរាណខ្មែរ សំបកដើមវាបុកលម្អិត ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលបួសរយ រលាកដោះ រើម (ប្រើ ខាងក្រៅ) ហើយសំបកវាក៏អាចដាំទឹកផឹកព្យាបាល មាស់ ឈឺចាប់ក្នុងស្បូន ចុកសាច់ដុំ ស្លឹក-ខ្វិន និង ឈឺក្នុងផ្លឹង។ ស្លឹកប្រើដូចសំបកដែរ បុកបិទលើរបួស ជួយយាត់ឈាម។ ឫសព្យាបាលរាគម្ពល និងរលាក ពោះវៀន (ដាំផឹក)។ |



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ រំដួល (ស៊ីផ្លែ)
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ White Cheesewood
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Melodorum fruticosum* Lour.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
- របាយប្រភេទ ៖ ជាព្រឹក្សាមានកម្ពស់ ៣ - ១០ម មានរបាយធម្មជាតិ នៅក្នុងកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម និងប្រទេសថៃ។ នៅ កម្ពុជា រំដួលមានដុះនៅខេត្តកំពង់ធំ សៀមរាប និង តំបន់ទន្លេមេគង្គ (រវាងខេត្តក្រចេះ និងស្ទឹងត្រែង)។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ រំដួល មិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងអំពីស្ថានភាពអភិរក្ស ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់វានៅឡើយទេ ហើយក៏មិនទាន់ មានការសិក្សាវាយតម្លៃស្ថានភាពអភិរក្សរបស់វានៅ ក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ដែរ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ផ្លែរំដួល គេចូលចិត្តបរិភោគណាស់ និងជួនកាលមាន ដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារផងដែរ។ ផ្ការបស់វាមានក្លិន ហើយពេលខ្លះគេដាំដើមរំដួលនៅក្នុងសួនឧទ្យាន ដើម្បីតុបតែងភាពស្រស់ស្អាត និងមានភាពទាក់ទាញ។




- | | |
|---------------------------------|---|
| - ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ | ៖ កប្បី |
| - ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស | ៖ Camphor Tree, Camphorwood, Camphor Laurel |
| - ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ | ៖ <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl |
| - ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ | ៖ តំបន់អាស៊ីប៉ែកខាងកើត (ចិន ជប៉ុន កូរ៉េ វៀតណាម) |
| - របាយប្រភេទ | ៖ ជាព្រឹក្សមានកម្ពស់ ១០ - ១៥ម ដុះនៅតំបន់ព្រៃបឋម (Primary Forest) ព្រៃក្បែរមាត់ទឹក នៅតាមដោយតំបន់ព្រៃរងទឹកភ្លៀង ឬនៅតំបន់ក្បែរផ្លូវ ដែលរបាយធម្មជាតិរបស់វាមានដុះនៅវៀតណាម ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េ ហើយត្រូវបានគេនាំចូលមកដាំ (Introduced) នៅប្រទេសជាច្រើនរួមមាន កម្ពុជា ឥណ្ឌា បង់ក្លាដែស ហ្វីលីពីន និងអាមេរិកជាដើម។ |
| - ស្ថានភាពអភិរក្ស | ៖ កប្បី ជាប្រភេទដែលមិនត្រូវបានគេព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាអភិរក្សរបស់វានោះទេ តែយ៉ាងណាវាត្រូវបានគេគេចាត់បញ្ចូលជាប្រភេទរក្សានៅក្នុងតំបន់នាំចូលមកដាំ ដោយសារវាមានគម្របដើមក្រាស់ (Dense Canopy) និងមានប្រកួតប្រជែងក្នុងការលូតលាស់ជាមួយប្រភេទរុក្ខជាតិដើមក្នុងតំបន់ (Native Species) ។ |
| - អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ | ៖ ដើមរបស់កប្បីអាចប្រើប្រាស់ធ្វើជាឈើសម្រាប់សាងសង់ ហើយគេអាចចំរាញ់វាយកប្រេងដែលមានក្លិនប្រហើរឆ្ងល សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាថ្នាំឈឺក្បាល វិលមុខ និងតឹងច្រមុះ។ ប្រេងរបស់វាត្រូវបានគេចំរាញ់ចេញពីផ្នែកឫស មែកនៃដើមឈើ ឬស្លឹកបៃតង។ |





- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ ផ្លឹក
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ គ្មាន
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Shorea obtusa* Wall. ex Blume
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់ឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន
- របាយប្រភេទ ៖ ផ្លឹកជាព្រឹក្ស កម្ពស់ ១០-៣០ម ដុះក្នុងព្រៃស្រោងលើទួល ឬភ្នំ (មានរយៈកម្ពស់ពី ១៥០-១៣០០) មានរបាយធម្មជាតិដុះនៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន (រួមមានកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ និងភូមា)។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ផ្លឹកមានដុះនៅខេត្តកំពង់ កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ កំពត ព្រៃវែង ពោធិ៍សាត់ និងស្ទឹងត្រែង។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ ផ្លឹកត្រូវបានវាយតម្លៃថាតំបន់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុម “ជិតទទួលរងការគំរាមកំហែង (Near Threatened)” នៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN។ ចំនួនប៉ូប៊ុយឡង់ស្យុងរបស់ផ្លឹកមានការថយចុះដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រក និងការកែប្រែដីព្រៃទៅជាដីកសិកម្ម។ ផ្លឹកក៏ត្រូវបានទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយសារការកាប់យកឈើសម្រាប់ការផ្គុំផ្សំផងដែរ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ជាប្រភេទឈើលេខមួយ ដែល សម្រាប់ធ្វើជាស្ពាន ធ្វើកំណល់ ឬសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះ។ បើដាក់ហាលភ្លៀងឈើនេះជាប់ត្រឹមតែ ១០ - ១៥ ឆ្នាំទេ តែបើនៅក្នុងម្លប់អាចជាប់យូរពី ៥០ - ៦០ ឆ្នាំ។ ជ័ររបស់វាគេអាចប្រើធ្វើជាចន្លុះ ឬផ្សំធ្វើឱសថគ្រុនចាញ់។ ជ័ររបស់វាគេប្រើឱ្យជ្រូកស៊ីកុំឱ្យមានកូន និងសំបកប្រើដាំទឹកផឹកសម្រាប់ស្រូវក្រោយឆ្លងទន្លេ ដើម្បីជំនួយសុខភាព។ ខ្លឹម ប្រើសម្រាប់ផ្សះ ធ្លាក់ស ចំរើនអាយុ ហើយឫសរបស់វា ប្រើជាថ្នាំពន្យារកំណើត (ដោយដាំទឹកផឹក)។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ ឈើទាលទឹក, ឈើទាលបាយ, ឈើទាលធំ
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ គ្មាន
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Dipterocarpus alatus* Roxb. ex G. Don
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ ឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន និងជ្វា
- របាយប្រភេទ ៖ ជាព្រឹក្ស កម្ពស់ ២៥ - ៤០ម ដុះនៅក្នុងព្រៃស្រោង ឬព្រៃក្រាស់មធ្យម នៅរយៈកម្ពស់ពី ៣០០ - ៩០០ម ដែលមានរបាយធម្មជាតិដុះនៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន (កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ ភូមា) និងជ្វា (Malay Peninsula) ឥណ្ឌា ស្រីលង្ការ និងបង់ក្លាដែស។ នៅកម្ពុជា ឈើទាលទឹកមានដុះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ធំ សៀមរាប កំពត ពោធិ៍សាត់ និងស្ទឹងត្រែង។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ ឈើទាលទឹកត្រូវបានវាយតម្លៃថាតំបន់ទៅក្នុងក្រុម “ងាយរងគ្រោះ (Vulnerable)” នៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN។ ចំនួនប៉ូប៉ូយឡាស្យុងរបស់វាមានការថយចុះ ដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ការកាប់ដកហូតឈើ និងការដកហូតយកជ័ររបស់វាហួសកម្រិតសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ ឈើទាលទឹកកំពុងត្រូវបានគេព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់នានាភាពនៃសេនេទិចរបស់ប៉ូប៉ូយឡាស្យុងប្រភេទរបស់វា។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ឈើមានតម្លៃណាស់សម្រាប់សាងសង់ផ្ទះ ឬធ្វើប្រដាប់តាំងលម្អ។ ជាញឹកញយ គេតែងចំកញ្ចៀងយកជ័រពីដើម សម្រាប់ប្រើការផ្សេងៗដូចជា បិទទុក ឬទុកធ្វើថ្នាំរម្ងាប់រោគ។ គ្រូថ្នាំខ្មែរយកជ័រឈើទាលទឹកលាយជាមួយក្រមួនធ្វើថ្នាំបំបាត់ជំងឺបំបៅរលួយ។ សំបកដើមតូចៗទើបទងមានស្លឹក ២-៤ គេប្រើជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺ សន្លាក់ផ្លឹង ថ្លើម ។ល។ ពេទ្យសត្វស្វាសំបកឱ្យសត្វពាហនៈដឹក ដើម្បីឱ្យវាស៊ីស្មៅបានច្រើនឆាប់ធំធាត់។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ គូលែន
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ Lychee, Litchi
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ *Litchi chinensis* Sonn.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ ចិនភាគខាងត្បូង និងវៀតណាមភាគខាងជើង
- របាយប្រភេទ ៖ ជាព្រឹក្ស កម្ពស់ ៨-១០ម ដុះនៅប្រទេសចិនខាងត្បូង និងវៀតណាមខាងជើង ហើយពួកជ្វា (Malaysia) បាននាំមកដាំយូរណាស់ហើយ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា គេឃើញដើមគូលែនដុះឯងៗ តែលើភ្នំគូលែនទេ តែក៏ត្រូវបានគេដាំជាចម្ការផងដែរ។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ គូលែនមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងពីស្ថានភាពអភិរក្សរបស់វាទេ ហើយក៏មិនទាន់មានការសិក្សាវាយតម្លៃពីស្ថានភាពគម្រាមកំហែងរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN ដែរ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ផ្លែសម្រាប់ធ្វើជាអាហារ ផ្លែស្រស់មានជីវជាតិ A និង B ជាច្រើន តែផ្លែគ្រាមគ្មានជីវជាតិនោះទេ ផ្លែខ្លីគេប្រើធ្វើថ្នាំអុតធំៗ គ្រូថ្នាំបុរាណស្វាម្ពោ សំបក និង ឫសគូលែនព្យាបាលជម្ងឺបំពង់ក។ គ្រាប់ជាថ្នាំពោះវៀន និងព្យាបាលជម្ងឺខ្លួនចុក ពងកោប លាយពក ឈឺក្រពះ ឈឺពោះវៀនតូចៗ សាច់អាចបំបាត់ការស្រេកទឹកហត់ហើមសួត កូនកណ្តុរ។



- | | |
|---------------------------------|---|
| - ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ | : អន្លង់-ស |
| - ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស | : Malaysian Ginseng |
| - ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ | : <i>Eurycoma longifolia</i> Jack |
| - ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ | : តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ |
| - របាយប្រភេទ | : អន្លង់-ស ជាចូលព្រឹក្សម្យ៉ាងកម្ពស់ ២-៥ម មានដុះនៅក្នុងព្រៃបឋម (Primary Forest) ព្រៃជុះបន្តបន្ទាប់ (Succession Forest) ព្រៃជ្រុះស្លឹកចម្រុះរងទឹកភ្លៀង ព្រៃតំបន់ឆ្នេរដីខ្សាច់ និងមានដុះនៅលើដីថ្មភក់ជាដើម ដែលរបាយធម្មជាតិរបស់វាមានដុះនៅកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ ភូមា និងម៉ាឡេស៊ី។ |
| - ស្ថានភាពអភិរក្ស | : អន្លង់-ស មិនទាន់ត្រូវបានសិក្សាវាយតម្លៃពីស្ថានភាពគម្រាមកំហែងរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN ទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេដឹងថាផ្នែកប្រសរបស់វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេ ដែលការប្រមូលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការគាស់រលើងផ្តុលដើមទាំងមូលដើម្បីប្រមូលយកឫស ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមានការព្រួយបារម្ភលើនិរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់វា។ |
| - អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ | : សំបក ផ្លែ និងឫស សម្រាប់ធ្វើឱសថបុរាណ។ សំបកជាថ្នាំរម្ងាប់រោគ ឬព្យាបាលបញ្ហាក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ផ្លែជាឱសថរាគមូល ឫសសម្រាប់បន្សាបពិស និងធ្វើឱ្យបាត់ស្រវឹងស្រា។ |



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ៖ មើមថ្នាំចិន, ប៉ប្រើស
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ៖ China Root, Sarsaparilla
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ៖ Wall. ex Roxb.
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ ៖ តំបន់ឥណ្ឌូចិន ប្រទេសចិន និងឥណ្ឌា
- របាយប្រភេទ ៖ មើមថ្នាំចិន ជាប្រភេទវល្ល័យមានបន្លាវាឡើងឈើធំៗ ក្នុងព្រៃក្រាស់ និងព្រៃស្រោង ដុះលើថ្ម លើភ្នំ ដែលមានកម្ពស់ដល់ ១៥០០ម។ របាយធម្មជាតិរបស់វាមានដុះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ចិន ថៃ កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម និងភូមា។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស ៖ មើមថ្នាំចិន មិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងពីស្ថានភាពអភិរក្សរបស់វានៅឡើយទេ ហើយក៏មិនទាន់មានការសិក្សាវាយតម្លៃពីស្ថានភាពគម្រាមកំហែងរបស់វានៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់ IUCN ដែរ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ ៖ ដើមវាអាចប្រើធ្វើចំណងបាន មើមវាគេតែងត្រាំស្រា ផឹកជាថ្នាំលើកកំលាំង។



- ឈ្មោះខ្មែរ/ឈ្មោះក្នុងតំបន់ : ចន្ទន៍ក្រស្នា
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស : Agarwood
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Aquilaria crassna* Pierre ex Lecomte
- ប្រភពដើម/ដើមកំណើតប្រភេទ : តំបន់ឥណ្ឌូចិន
- របាយប្រភេទ : ឈើធំកម្ពស់ ១៥-២០ម ដុះក្នុងព្រៃស្រោងដីទំនាប ព្រៃបឋម ព្រៃដុះបន្តបន្ទាប់ នៅលើប្រភេទដីមានថ្ម និងនៅតាមតំបន់ក្បែរមាត់ទឹកក្នុងព្រៃ។ របាយធម្មជាតិរបស់ចន្ទន៍ក្រស្នាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម និងថៃ។ នៅកម្ពុជា វាមានដុះនៅខេត្តកំពង់ធំ សៀមរាប កំពត កណ្តាល និងខេត្តកោះកុង។
- ស្ថានភាពអភិរក្ស : ចំនួនក្រស្នា ត្រូវវាយតម្លៃថាតំបន់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុម "ទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរ (Critically Endangered) នៅក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN។ វាទទួលរងការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការដកហូតឫសកម្រិតសម្រាប់ យកខ្លឹមនិងប្រេងក្រអូបរបស់វាធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ នៅកម្ពុជា ចំនួនក្រស្នាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថានៅមានចំនួន តិចតួច និងនៅមានតែក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះ។
- អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ : ខ្លឹមចំនួនក្រស្នាក្រអូបណាស់ ប្រើធ្វើបុណ្យខ្មោច ដោយធ្លាក់ជាប្រដាប់ក្នុងខ្លឹម ដែលគេកាត់ស្តើងៗ ហើយដុតពេលបូជាសព។ ខ្លឹមរបស់វា ប្រើជំនួយរំលាយអាហារ ដើរខ្យល់ កាត់ស្មៅស្ម័គ្រ បំបាត់ក្លិន ឆ្ងាញ់បាយ បំបាត់ឈឺចុកចាប់ បំបាត់រលាក បំបាត់យឺត ធ្វើឱ្យចេញញើស ជំនួយឱ្យមានកំដៅ និងជួយបញ្ជារលាកតំរងនោម។ សាច់ឈើអាចជួយឱ្យឆ្ងាញ់បាយ ជួយឱ្យមានកំដៅ និងរលាកតំរងនោម។ ប្រេងព្យាបាលស្បែកជំងឺសន្លាក់ដៃជើង ហឺត និងរលាកទងសួត។ ឫសព្យាបាលរោគព័ន្ធផ្លូវ (ហើមពេញខ្លួន)។ ខ្លឹម សាច់ឈើ និងឫសអាចប្រើជាទឹកហូប ឬធ្វើជាថ្នាំគ្រាប់។

ឯកសារយោង

1. Cho, S.H., Chhang, P. & Kim, Y.D. (2016). A checklist for the seed plants of Cambodia. National Institute of Biological Resources, Ministry of Environment, Incheon, Korea. 272pp.
2. Khou, E.H. (2008). A Field Guide of the Rattans of Cambodia. WWF Greater Mekong – Cambodia Country Programme.
3. Pauline, D.P. (2000). Plants used in Cambodia.
4. Peters, C.M. & Henderson, A. (2014). ប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់ អេកូឡូស៊ី និងការគ្រប់គ្រងប្រភេទផ្លៅនៅកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម។ មូលដ្ឋានដីវៈសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
5. <https://www.iucnredlist.org>
6. រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា ភាគ៤ (២០១០)។ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ (ក្រសួងសុខាភិបាល)
7. រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា ភាគ៣ ពីអក្សរ ក ដល់ ឌី (២០០៩)។ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ (ក្រសួងសុខាភិបាល)
8. រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា ភាគ១ ពីអក្សរ ក ដល់ ផ (២០០៨)។ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ (ក្រសួងសុខាភិបាល)
9. រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា ភាគ២ ពីអក្សរ ផ ដល់ អ (២០០៨)។ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ (ក្រសួងសុខាភិបាល)